

临床助理医师考试:《答疑周刊》2019 年第 23 期

【女性生殖系统】

第一产程活跃期停滞是指宫口不再扩张达

- A. 0.5 小时以上
- B. 1 小时以上
- C. 1.5 小时以上
- D. 4 小时以上
- E. 2.5 小时以上

【正确答案】D

【答案解析】活跃期停滞: 进入活跃期后, 宫口不再扩张达 4 小时以上, 称活跃期停滞。

活跃期延长: 从宫口扩张 3cm 开始至宫口开全称活跃期。初产妇活跃期正常约需 4 小时, 最大时限 8 小时, 超过 8 小时称活跃期延长。

妊娠合并糖尿病对胎儿的影响正确的是

- A. 巨大胎儿
- B. 胎儿生长受限
- C. 流产
- D. 胎儿畸形
- E. 以上都是

【正确答案】E

【答案解析】妊娠合并糖尿病时对胎儿的影响有: 巨大胎儿、胎儿生长受限、流产和早产、胎儿畸形所以选 E。

心脏病孕妇最容易发生心力衰竭的时期是

- A. 妊娠 20~22 周
- B. 妊娠 24~26 周
- C. 妊娠 28~30 周
- D. 妊娠 32~34 周
- E. 妊娠 36~38 周

【正确答案】D

【答案解析】血容量自孕 6~8 周母体血容量开始增加, 孕 32~34 周时达高峰, 约增加 40%-45%, 平均增加 1450ml。

下列因素可以引起脐带先露的是

- A. 头盆不称
- B. 胎儿过大
- C. 羊水过少
- D. 脐带过短
- E. 胎盘早剥

【正确答案】A

【答案解析】容易发生在胎先露未衔接时: ①头盆不称、胎头入盆困难; ②臀先露、肩先露、枕后位等胎位异常; ③胎儿过小; ④羊水过多; ⑤脐带过长; ⑥脐带附着异常及低置胎盘等。

初孕妇, 25 岁, 妊娠 40 周, 入院前 1 日出现不规律子宫收缩, 入院 24 小时后静滴缩宫素引产, 第 1 产程 5 小时, 第 2 产程 10 分钟, 胎儿娩出后 2 分钟, 产

妇突然出现寒战, 咳嗽, 发绀, 血压 60/40mmHg, 随后阴道流血不止, 立即配血进行抢救。最可能的诊断是

- A. 羊水栓塞
- B. 急性肺栓塞
- C. 子宫收缩乏力性出血
- D. 缩宫素过敏
- E. 心源性休克

【正确答案】 A

【答案解析】该产妇使用缩宫素静滴引产, 胎儿娩出 2 分钟, 产妇突然出现寒战, 咳嗽, 发绀, 血压 60/40mmHg, 提示发生了羊水栓塞。

临床助理医师考试:《答疑周刊》2019 年第 23 期 (word 版下载)
【医学教育网版权所有, 转载务必注明出处, 违者将追究法律责任】