

主管护师：《答疑周刊》2020 年第 38 期

1. 【问题】直疝与斜疝的鉴别点是什么？

【解答】

鉴别点	斜疝	直疝
发病年龄	多见于儿童及青壮年	多见于老年
突出途径	经腹股沟管突出，可进阴囊	由直疝三角突出，不进阴囊
疝块外形	椭圆或梨形，上部呈蒂柄状	半球形，基底较宽
回纳疝块后压住深环	疝块不再突出	疝块仍可突出
精索与疝囊的关系	精索在疝囊后方	精索在疝囊前外方
疝囊颈与腹壁下动脉的关系	疝囊颈在腹壁下动脉外侧	疝囊颈在腹壁下动脉内侧
嵌顿机会	较多	较少

2. 【问题】下列哪项是诊断轻度有机磷中毒时血胆红素酯酶活性的值

A ≤90%

B ≤80%

C ≤70%

D ≤60%

E ≤50%

【正确答案】C

【学员问题】学员有点理解不了这道题选择那个？

【解答】①轻度中毒 全血胆碱酯酶活力一般在 50%~70%。

②中度中毒 全血胆碱酯酶活力降至 30%~50%。

③重度中毒 全血胆碱酯酶活力降至 30%以下。

3. 【问题】患者体外冲击波碎石后的排石体位？

【解答】根据结石部位，指导体外冲击波碎石治疗后的排石体位：

- ① 结石在中肾盏、肾盂、输尿管上段者，碎石后取头高脚低位；
- ② 结石在肾下盏者取头低位；
- ③ 肾结石碎石后，一般取健侧卧位，同时叩击患侧肾区，利于碎石有肾盏排入肾盂、输尿管；
- ④ 巨大肾结石碎石后宜取患侧卧位，利于结石随尿液缓慢排出，因为巨大肾结石碎石后可因短时间内大量碎石突然积聚于输尿管而发生堵塞，引起“石街”和继发感染，严重者引起肾功能改变。

4. 【问题】新生儿寒冷损伤综合征硬肿程度的分度、计算方式及复温？

【解答】硬肿可分轻、中、重三度，常与硬肿发生的范围有关，分为：

轻度 < 20%；中度 20% ~ 50%；重度 > 50%。

硬肿范围的计算方法：头颈部 20%，双上肢 18%，前胸及腹部 14%，背及腰骶部 14%，臀部 8%，双下肢 26%。

肛温 > 30℃，腋-肛温差为正值之轻、中度硬肿的患儿可放入 30℃ 暖箱中，根据体温恢复的情况逐渐调整到 30~34℃ 的范围内，6~12 小时恢复正常体温。

肛温 < 30℃，腋-肛温差为负值的重度患儿，先将患儿置于比肛温高 1~2℃ 的暖箱中，并逐步提高暖箱的温度，每小时升高 1℃，每小时监测肛温、腋温 1 次，于 12~24 小时恢复正常体温。