

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2022 年第 24 期

问题索引：

1. 【问题】什么是高血压急症？
2. 【问题】青霉素、破伤风、链霉素的皮试剂量是多少？
3. 【问题】急性肾衰竭的临床表现？
4. 【问题】Glasgow 评分怎么评？

具体解答：

1. 【问题】什么是高血压急症？

【解答】高血压急症指原发性或继发性高血压病人，在某些诱因作用下，血压突然和显著升高(一般超过 180/120mmHg)，同时伴有进行性心、脑、肾等重要靶器官功能不全的表现。[医学 教育网]高血压急症包括高血压脑病、颅内出血(脑出血和蛛网膜下腔出血)、脑梗死、急性心力衰竭、急性冠状动脉综合征、主动脉夹层动脉瘤、子痫、急性肾小球肾炎等。

2. 【问题】青霉素、破伤风、链霉素的皮试剂量是多少？

【解答】(1) 青霉素过敏试验液的剂量以每毫升含 200~500U 的青霉素生理盐水溶液为标准。皮内注入 0.1ml 含青霉素 20~50U。

(2) 破伤风过敏试验液的剂量以每毫升含 150U 的 TAT 生理盐水溶液为标准，皮内注入 0.1ml 含 TAT15U。[医学教育 网]

(3) 链霉素过敏试验液的剂量每毫升含 2500U 链霉素生理盐水溶液为标准，皮内注入 0.1ml 含链霉素 250U。

3. 【问题】急性肾衰竭的临床表现？

【解答】(1)少尿或无尿期 成人 24 小时总尿量少于 400ml 称为少尿，不足 100ml 为无尿。一般可持续 7~14 日，平均 5~6 日，最长达 1 个月以上。

(2) 多尿期 常表示急性肾衰竭向好的方向发展，如每日尿量超过 400ml，则表示进入多尿期，最多可达 3000ml 以上，有时会高达 5000~7000ml。

(3) 恢复期 血肌酐及尿素氮逐渐下降，待尿素氮处于稳定后即进入恢复期，

但要恢复正常还需要较长时期，部分病人较长时间不能恢复而转入慢性肾衰竭。

[医学 教育网]

4. 【问题】Glasgow 评分怎么评？

【解答】格拉斯哥昏迷评分量表适用于意识障碍病人的测定

睁眼反应	分数	言语反应	分数	运动反映	分数
自动睁眼	4	回答正确	5	遵嘱活动	6
呼唤睁眼	3	回答错误	4	刺痛定位	5
刺痛睁眼	2	语无伦次	3	躲避刺痛	4
不能睁眼	1	只能发声	2	刺痛屈曲	3
		不能发声	1	刺痛肢伸	2
				不能活动	1