

中医内科主治医师考试:《答疑周刊》2022年第34期

问题索引:

1. 方中温、补、通并用的方剂是
2. 与肾主水液作用最为密切的是
3. 补气养血药中加入适量肉桂,其主要目的是
4. 病人但卧不能坐,坐则昏眩,属
5. 上腔静脉阻塞时,腹壁静脉曲张的血流方向为

具体解答:

1. 方中温、补、通并用的方剂是
 - A. 四逆汤
 - B. 四逆散
 - C. 吴茱萸汤
 - D. 理中丸
 - E. 当归四逆汤

【答案】E

【解析】吴茱萸汤主治有三证,病机则同属虚寒之邪上逆犯胃所致。治当温中补虚,降逆止呕。方中吴茱萸上可温胃寒,下可暖肝肾,又能降逆止呕,[医学教育网原创]一药三擅其功而为君。重用生姜为臣,温胃散寒,降逆止呕。佐以人参补益脾胃之虚;佐使以大枣,益气补脾,调和诸药。全方肝、肾、胃同治,温、降、补并施。故本题选C。

2. 与肾主水液作用最为密切的是

- A. 肾阳的温化
- B. 肾阴的滋润
- C. 肾血的营养
- D. 肾中精气的气化
- E. 脾肺里两脏的协调作用

【答案】 D

【解析】肾中精气的蒸腾气化主宰着津液代谢，肺、脾等内脏对津液的气化作用，均依赖于肾中精气的蒸腾气化。特别是尿液的生成和排泄，更是与肾中精气的蒸腾气化直接相关，而尿液的生成和排泄，在维持津液代谢平衡中又起着极其关键的作用。如果肾中精气的蒸腾气化失常，既可引起关门不利，发生尿少、水肿等病理现象；又可引起气不化水，出现小便清长、尿量增多等病理现象。[医学教育网原创]

3. 补气养血药中加入适量肉桂，其主要目的是

- A. 引火归原
- B. 鼓舞气血生长
- C. 散寒止痛
- D. 补而不滞
- E. 以上都不是

【答案】 B

【解析】肉桂治疗气血虚衰，有鼓舞气血生长之效。因此久病体虚气血不足者，在补益气血方中加入少量肉桂，可鼓舞气血生长。故最佳的选项是 B。[医学教育网原创]

4. 病人但卧不能坐，坐则昏眩，属

- A. 哮喘
- B. 肺胀
- C. 气胸
- D. 痰饮停肺
- E. 气血俱虚

【答案】E

【解析】但卧不得坐，坐则神疲或昏眩，多为气血俱虚，或夺气脱血，或肝阳化风。故本题选 E。[医学教育网原创]

5. 上腔静脉阻塞时，腹壁静脉曲张的血流方向为

- A. 脐上脐下均向上
- B. 脐上脐下均向下
- C. 脐上向上、脐下向下
- D. 脐上向下、脐下向上
- E. 以上均非

【答案】B


【解析】腹壁静脉

正常时腹壁静脉一般不显露。当门静脉高压或上、下腔静脉回流受阻导致侧支循环形成时，腹壁静脉呈现扩张、迂曲状态，称为腹壁静脉曲张。

(1) 门脉高压时，腹壁曲张的静脉以脐为中心向周围伸展，肚脐以上腹壁静脉血流方向从下向上，肚脐以下腹壁静脉血流方向自上向下。

(2) 上腔静脉梗阻时，胸腹壁静脉血流方向自上向下，流入下腔静脉。

(3) 下腔静脉梗阻时, 腹壁浅静脉血流方向向上, 进入上腔静脉。故本题选 B。[医学教育网原创]



正保医学教育网
www.med66.com