

护士执业资格

—— 基础测评 50 题

医学教育网 著



扫码回复“基础测评”领取答案及解析

《基础测评 50 题》

1. 患者，男性，45 岁。3 个月前排便次数增多，腹泻、便秘、便中带血，左下腹持续性隐痛，近 1 个月出现黏液血便，为确定诊断，最简便有效的检查方法是

A. 直肠指检

B. 粪便隐血试验

C. 纤维结肠镜

D. 血清癌胚抗原测定

E. 腹部 CT

2. 患者男性，40 岁，胸腹部损伤后并发急性呼吸衰竭，行呼吸机辅助呼吸，若给予潮气量过大，频率过快，可引起


A. 代谢性酸中毒

B. 代谢性碱中毒

C. 呼吸性酸中毒

D. 呼吸性碱中毒

E. 混合性酸中毒



3. 患儿男，10个月。采用牛乳喂养，未加辅食，因皮肤、黏膜苍白就诊。诊断为缺铁性贫血，护士对家长健康指导最重要的是

- A.防止外伤
- B.预防患儿感染
- C.预防心力衰竭
- D.限制患儿活动
- E.为患儿补充含铁辅食

4. 患者，男性，30岁。车祸急诊入院后发生低血容量性休克，护士为其采取中凹卧位的抬高要求是

- A.上身 5° ~ 10° 、下肢 15° ~ 20°
- B.上身 10° ~ 20° 、下肢 20° ~ 30°
- C.上身 5° ~ 10° 、下肢 20° ~ 30°
- D.上身 15° ~ 20° 、下肢 10° ~ 15°
- E.上身 20° ~ 25° 、下肢 20° ~ 25°

5. 患者，男性，70岁。需输1000ml液体，用滴系数为15的输液器，每分钟40滴，输完需用

- A.2小时15分钟

B.2 小时 45 分钟

C.4 小时 15 分钟

D.4 小时 45 分钟

E.6 小时 15 分钟

6. 患者女性，29 岁，诊断为白血病，行化疗过程中致口腔溃疡需做咽拭子培养。护士为其采集标本部位应选

A.口腔溃疡面

B.两侧腭弓

C.舌根部

D.扁桃体

E.咽部


7. 心脏复苏首选的药物是

A.阿托品

B.利多卡因

C.肾上腺素

D.异丙肾上腺素



E.氯化钙

8. Osler 结见于

A.急性风湿热

B.系统性红斑狼疮

C.急性病毒性心肌炎

D.亚急性细菌性心内膜炎

E.结核性胸腺炎

9. 患者女性，30岁，因患慢性风湿性心瓣膜病、二尖瓣狭窄收入院。患者近来症状严重，医生要求护士观察心律变化，及时发现心律失常的发生。风心病二尖瓣狭窄最常见的心律失常是

A.心房颤动

B.窦性心动过速

C.窦性心动过缓

D.室性期前收缩

E.房室传导阻滞

10. 患者男性，60岁，因胸痛就诊，既往有心绞痛十年。鉴别急性心肌梗死与心绞痛，症状的主要区别是

A.疼痛持续时间不同

B.疼痛表现不同

C.疼痛部位不同

D.疼痛性质不同

E.引起诱因不同

11. 患者男,65岁,高血压数年,服用降压药出现眩晕、恶心、眼花,测血压值100/65mmHg,

家人给予平卧位,其最主要目的是

A.增加回心血量,改善脑部血液供应

B.减少回心血量,减轻心脏负担

C.避免脑出血的发生

D.防止病人发生意外摔倒


E.平卧位体位较舒适,适宜病人安静休息

12. 法洛四联症患者青紫轻重取决于

A.主动脉骑跨程度

B.卵圆孔是否关闭

C.室间隔缺损大小



D.右心室肥厚程度

E.肺动脉狭窄程度

13. 频发室性期前收缩的定义是

A.室性期前收缩 > 60 次/分钟

B.室性期前收缩 > 30 次/分钟

C.室性期前收缩 > 20 次/分钟

D.室性期前收缩 > 10 次/分钟

E.室性期前收缩 > 5 次/分钟

14. 患者男性，65 岁，间断胸闷 1 周，1 天前于夜间突然被迫坐起，频繁咳嗽，严重气急，咳大量粉红色泡沫痰，既往患冠心病十年。考虑该患者发生了左心衰、急性肺水肿，给氧方式应采用


A.高流量，20%~30%乙醇湿化

B.低流量，30%~50%乙醇湿化

C.高流量，10%~20%乙醇湿化

D.低流量，10%~20%乙醇湿化

E.持续低流量给氧



15. 患者男性，45岁，反复上腹痛10余年，近2个月疼痛加重，检查示胃酸缺乏，进一步的治疗方案首选

A.X线钡餐检查

B.三联疗法

C.胃镜检查及组织活检

D.大便隐血试验

E.预防性手术治疗

16. 为急性胰腺炎患者解痉镇痛时，不能使用的药品是

A.山莨菪碱

B.吗啡

C.阿托品

D.哌替啶

E.普鲁本辛

17. 典型的 Charcot 三联征为腹痛、寒战高热及

A.呕吐

B.腹泻

C.黄疸

D.腹水

E.胸痛

18. 女性, 8岁, 阵发性剑突下钻顶样痛半天, 伴恶心呕吐, 既往有类似发作史。查体, T37.5°C,

剑突下深压痛, 无腹肌紧张, 拟诊为

A.肝内胆管结石

B.胆道蛔虫病

C.胆总管结石

D.急性胆管炎

E.胆囊结石

19. 患者男性, 40岁, 急诊入院, 神志不清, 出冷汗, 脉搏细数, 血压 80/45mmHg, 诊


断为“急性梗阻性化脓性胆管炎”, 其体位应取

A.半坐卧位

B.坐位

C.中凹卧位

D.头高足低位



E.任意卧位

20. 患者男性，50岁，因肝硬化腹水入院。住院期间患者突然出现淡漠少言，神情恍惚，衣冠不整，吐词不清。此时应警惕患者可能出现了

A.肝癌

B.继发感染

C.肝性脑病

D.肝肾综合征

E.上消化道出血

21. 肝叶切除术后避免过早活动的目的是

A.保存体力

B.减少能量消耗

C.利于肝细胞再生

D.利于有效引流

E.避免肝断面出血

22. 患者，男性，68岁。肝硬化腹水，体质虚弱，生活不能自理，护士为患者做口腔护理时，应特别注意口腔有无

A. 糜烂溃疡

B. 烂苹果味

C. 臭鸡蛋味

D. 肝臭味

E. 腐臭味

23. 女，45岁。诊断为骨盆直肠间隙脓肿。其后期治疗的有效措施

A. 全身抗生素

B. 局部理疗

C. 切开引流

D. 刺穿抽脓

E. 肛门坐浴


24. 冯先生，用力排便后出现肛门剧痛，无便血。检查见肛管皮下暗紫色肿块，有触痛。首

先考虑是

A. 嵌顿性内痔

B. 血栓性外痔

C. 肛旁皮肤脓肿



D.肛裂

E.直肠息肉

25. 患者，男性，62岁。左侧腹股沟斜疝嵌顿1小时，经手法复位成功。护士应观察的重点是

A.疝块有无再次出现

B.恶心、呕吐

C.腹痛、腹膜刺激征

D.感染中毒症状

E.疝块部位红、肿、痛

26. 患者女性，48岁，阑尾炎术后第二天，为预防术后肠粘连的最关键措施为

A.给予半坐卧位

B.观察腹部情况

C.进行深呼吸运动

D.早期下床活动

E.合理增加营养

27. 肠梗阻非手术治疗期间梗阻解除的标志是


- A.胃肠减压后腹痛减轻
- B.呕吐后腹胀减轻
- C.轻度压痛无肌紧张
- D.肛门排便、排气
- E.肠鸣音亢进转为消失

扫码回复“基础测评”领取答案及解析



28. 腹泻、脱水患儿经补液治疗后已排尿，按医嘱继续输液 400ml，需加入 10%氯化钾最多不应超过

- A.6ml
- B.8ml
- C.10ml
- D.12ml
- E.14ml



29. 消化性溃疡病人在何种条件下疼痛节律会改变或消失

A. 疲劳时

B. 饮酒时

C. 受凉时

D. 焦虑时

E. 癌变时

30. 与慢性胃炎的发病有关的细菌是

A. 痢疾杆菌感染

B. 军团菌感染

C. 幽门螺旋杆菌感染

D. 肺炎球菌感染

E. 大肠杆菌感染

31. 某老年呼吸衰竭患者, 近来呼吸困难明显, 又出现头痛、头胀, 且日轻夜重, 昼睡夜醒,

伴局限性肌群抽搐、神志恍惚等, 应考虑并发了

A. 脑疝

B. 脑瘤



C.肺性脑病

D.呼吸性酸中毒

E.脑炎

32. 慢性肺源性心脏病的症状加重主要由于

A.呼吸道感染

B.过度劳累

C.摄入钠盐过多

D.心律失常

E.停用洋地黄类制剂

33. 患者女, 48 岁。哮喘持续发作, 呼吸 36 次/分, 吸气时脉搏明显减弱, 此时该患者的

脉搏属于


A.奇脉

B.短绌脉

C.洪脉

D.交替脉

E.水冲脉



34. 形成慢性阻塞性肺气肿最常见的病因是

A.慢性支气管炎

B.支气管哮喘

C.支气管扩张

D.肺结核

E.肺间质纤维化

35. 李先生，21岁。咳嗽、咳脓痰10年，间歇咯血，体检左下肺背部闻及湿啰音，有杵状指，诊断首先考虑

A.肺结核

B.支气管扩张

C.支气管哮喘


D.慢性支气管炎

E.肺癌

36. 肺炎最常见的病原体是

A.细菌

B.病毒



C.支原体

D.衣原体

E.军团菌

37. 某肺结核患者，27岁，给予异烟肼、利福平等药物继续化疗，请问肺结核的主要传染源是

A.污染的食物

B.污染的用具

C.污染的水源

D.伤口感染

E.排菌的肺结核病人


38. 患者女，宫内妊娠39周，食欲正常。昨晚8时起有不规律宫缩，一夜未眠，今晨6时入院，精神疲乏，宫缩10~20秒，间隔10~20分钟，宫缩强度弱，肛查：头先露，未入盆，宫口开1指尖，前羊膜囊不明显，骨盆测量无异常，正确的处理方式是

A.人工破膜

B.缩宫素静脉滴注

C.肥皂水灌肠

D.遵医嘱给予哌替啶100mg肌内注射



E.补液支持疗法

39. 妊娠合并糖尿病筛查的时间是

A.妊娠 12~14 周

B.妊娠 14~16 周

C.妊娠 16~18 周

D.妊娠 18~20 周

E.妊娠 24~28 周

40. 孕妇，妊娠 37 周，无诱因性阴道出血约 200ml，腹部检查：腹软无压痛，胎位清楚，

胎心 158 次/分，阴道可见少量活动性出血，最可能的诊断是

A.胎盘早剥

B.早产

C.前置胎盘

D.妊高征

E.凝血功能障碍

41. 一早产男婴，日龄 4 天。不吃不哭、体温不升，呼吸浅表。查体：下肢、臀部皮肤发硬，

呈暗红色，伴水肿。应首先考虑为

A.新生儿败血症

B.新生儿硬肿症

C.新生儿颅内出血

D.新生儿脑膜炎

E.新生儿破伤风

42. 引起早产儿颅内出血最常见的原因是

A.缺血缺氧

B.快速输入高渗液体

C.分娩时产伤

D.血管畸形

E.感染


43. 患者，女，25岁，诊断为滴虫性阴道炎，询问用自助冲洗器灌洗阴道的方法，护士应

告知她最适宜的冲洗液为

A.5.5%醋酸溶液

B.1‰高锰酸钾溶液

C.生理盐水



D.1%乳酸溶液

E.2%碳酸氢钠溶液

44. 前列腺增生症状最先出现的是

A.排尿困难

B.膀胱刺激症状

C.血尿

D.尿频

E.脱肛

45. 患儿，男，5岁，全身水肿、尿少6天，以“原发性肾病综合征”入院。护士进行健康

评估时，最重要的评估内容是


A.饮食情况

B.大便情况

C.尿量情况

D.睡眠情况

E.水肿情况




46. 患者男，35岁，意外发生车祸导致腰椎骨折，需卧床休息半年，家庭本身贫困，自己无经济来源又拖累家人，患者整日郁郁寡欢，觉得自己活着无用，除了连累别人一事无成，整夜失眠，无食欲，诊断为抑郁症，针对此阶段应重点留意患者是否有

- A. 抑郁行为
- B. 自杀行为
- C. 营养不良
- D. 社交障碍
- E. 睡眠质量差

47. 年轻女性，因与朋友发生争吵后。自服敌敌畏 100ml，出现有机磷中毒中枢神经系统症状，严重时可发生

- A. 呼吸肌麻痹
- B. 呼吸困难
- C. 肺水肿
- D. 呼吸中枢衰竭或脑水肿而死亡
- E. 抽搐和昏迷



48. 患者，男性，27岁。被沸水烫伤，右手掌焦痂呈皮革样，不痛；面部红斑，表面干燥；左上肢、颈部、胸腹部、双足和双小腿均有水疱，伴剧痛。并发生低血容量性休克。估计该患者Ⅱ度烧伤面积为
- A.54%
- B.48%
- C.45%
- D.58%
- E.39%
49. 支气管肺癌常见的呼吸系统早期症状是
- A.声音嘶哑
- B.胸痛
- C.气促
- D.刺激性干咳
- E.发热
50. 患者严重贫血，近日突发高热、皮肤广泛瘀斑。若诊断急性白血病，最有价值的检查是
- A.血常规检查

B.尿液常规检验

C.血培养检查

D.CT 检查

E.骨髓象检查

扫码回复“基础测评”领取答案及解析

