

主管护师

—— 基础测评 50 题

医学教育网 著



扫码回复“基础测评”领取答案及解析

《基础测评 50 题》

1.肝硬化腹水产生的最主要原因是

- A.血清白蛋白降低
- B.门静脉压力增高
- C.肾功能不全
- D.脾功能亢进
- E.便秘

2.成人缺铁性贫血最常见的病因是

- A.铁摄入不足
- B.铁丢失过多
- C.慢性胃炎
- D.慢性感染
- E.慢性失血

3.蛛网膜下腔出血最常见的病因是

- A.血液病
- B.脑动脉炎



C.脑动静脉畸形

D.高血压性动脉硬化

E.先天性动脉瘤破裂

4.临床上心肌梗死急性期最常见的心电图改变是

A.ST 段压低

B.R 波减低

C.T 波平坦

D.ST 段弓背向上抬高

E.病理性 Q 波

5.一氧化碳中毒的机制，描述正确的是

A.HbCO 的解离较氧合血红蛋白的解离速度快 3600 倍

B.氧合血红蛋白的解离较 HbCO 的解离速度快 240 倍

C.O₂ 与血红蛋白亲和力比 CO 与血红蛋白亲和力大 3600 倍

D.CO 与血红蛋白亲和力比 O₂ 与血红蛋白亲和力大 240 倍

E.O₂ 与血红蛋白亲和力比 CO 与血红蛋白亲和力大 240 倍

6.慢性胃炎诊断的重要方法是

A.症状、体征

B.钡剂检查

C.胃液分析

D.胃镜检查

E.胃泌素及壁细胞抗体测定

7.儿童糖尿病较常见的类型为

A.1 型

B.2 型

C.3 型

D.4 型

E.5 型


8.肾损伤最严重的是

A.肾挫伤

B.肾盂部分裂伤

C.肾皮质部分裂伤

D.肾全层裂伤



E.肾蒂损伤

9.大肠癌的初步筛查选择

A.腔内 B 超检查

B.CEA 测定

C.内镜检查

D.直肠指检

E.大便潜血检查

10.腹膜刺激征是指

A.压痛、反跳痛、肌紧张

B.肠鸣音亢进、压痛、反跳痛

C.肠鸣音消失、腹痛、腹泻


D.板状腹、压痛、腹泻

E.反射性呕吐、恶心、腹泻

11.骨巨细胞瘤属于

A.骨瘤样病损

B.良性肿瘤



- C.继发性肿瘤
- D.恶性肿瘤
- E.潜在恶性肿瘤


12.切口疝最常见的发病原因是

- A.营养不良
- B.切口感染
- C.切口血肿
- D.术后咳嗽、腹胀
- E.放置引流物时间过长

13.少尿是指 24h 尿量少于

- A.50ml
- B.100ml
- C.150ml
- D.400ml
- E.500ml

14.非特异性感染除外



A.痛

B.丹毒

C.肾盂肾炎

D.气性坏疽

E.急性胆囊炎

15.慢性胎儿窘迫最常见的原因是

A.胎盘早剥

B.脐带受压

C.胎盘功能不良

D.宫缩过强或持续时间过长

E.羊水过多


16.胎膜早破的确诊方法为

A.双合诊

B.肛查

C.腹部检查

D.阴道窥器检查



E.阴道流液酸碱试纸测定

17.关于产后出血的原因，正确的是

A.多胎妊娠、巨大儿、羊水过多等导致子宫过度膨胀，使子宫肌纤维失去弹性，可能会致产后出血

B.过多使用宫缩药物，也可导致产后出血

C.外阴伤口感染也会引起产后出血

D.产后胎盘类固醇分泌突然减少，胎盘分泌的绒毛膜促性腺激素，雌、孕激素含量急剧下降，可能会引起出血

E.临产后未使用镇静剂、麻醉剂，烦躁不安者，也会导致产后出血

18.正常骨盆的形状是

A.骨盆的入口平面和中骨盆平面呈横椭圆形，出口平面呈纵椭圆形

B.骨盆的入口平面和出口平面呈纵椭圆形，中骨盆平面呈横椭圆形

C.骨盆的入口平面和中骨盆平面呈纵椭圆形，出口平面呈两个不同平面的三角形

D.骨盆的入口平面呈横椭圆形，中骨盆平面呈纵椭圆形，出口平面呈两个不同平面的三角形

E.骨盆的入口及出口平面呈横椭圆形，中骨盆平面呈纵椭圆形

19.婴幼儿缺铁性贫血的最主要原因是

A.先天储备铁不足

B.铁摄入不足

C.生长发育过快

D.铁吸收障碍

E.铁丢失及利用障碍

20.极低出生体重儿是指

A.出生 1 小时内体重不足 1000g

B.出生 1 小时内体重不足 1250g

C.出生 1 小时内体重不足 1500g

D.出生 1 小时内体重不足 2000g

E.出生 1 小时内体重不足 2500g


21.引起新生儿窒息的因素不包括

A.母亲患糖尿病

B.急产

C.脐带绕颈

D.早产儿



E.胎粪吸入

22.生理性腹泻多见于

A.6个月以内婴儿

B.1岁以内婴儿

C.2~3岁幼儿

D.5~6岁儿童

E.7~10岁儿童

23.下面几种头先露哪种最常见

A.面先露

B.枕先露

C.顶先露

D.额先露

E.前凶先露

24.可以早期鉴别葡萄胎和侵蚀性葡萄胎的检查是

A.胸部X线摄片

B.刮宫葡萄胎标本



- C.B 超及彩色多普勒
- D.子宫输卵管造影术或宫腔镜
- E.血清 β -hCG 检测

扫码回复“基础测评”领取答案及解析




25.健康教育与卫生宣教的区别在于

- A.注重知识灌输
- B.注重环境改善
- C.注重教育效果评价
- D.不仅注重知识改变而且注重行为改变
- E.注重计划教育

26.健康教育的实质是

- A.提高认识
- B.改变态度



C.卫生宣教

D.行为干预

E.重在预防

27.医院的灭菌合格率必须达到

A.100%

B.99.99%

C.99.9%

D.99%

E.95%

28.白色念珠菌属于

A.细菌


B.病毒

C.真菌

D.支原体

E.立克次体

29.ICU 最常见的条件致病菌是



A.肺炎克雷伯菌

B.大肠埃希菌

C.铜绿假单胞菌

D.耐甲氧西林金黄色葡萄球菌

E.洋葱伯克霍德菌

30.护患沟通时倾听的主要技巧是

A.集中精力、及时反馈

B.转移患者伤感的话题

C.重复患者的问题

D.对患者提出感兴趣的问题

E.澄清患者的错误观点


31.计划工作的核心是

A.实施

B.决策

C.监督

D.反馈



E.结果

32.护理组织文化的核心是

A.护理理念

B.护理程序

C.整体护理

D.护理价值观

E.护理服务观

33.PDCA 循环管理的四个阶段是

A.计划、执行、检查、反馈

B.组织、执行、检查、处理

C.计划、执行、反馈、处理

D.计划、执行、检查、处理

E.组织、执行、评价、处理

34.对成年人做 CPR, 无论是两人还是一人施救, 胸部按压次数和人工呼吸次数, 均为

A.30:2

B.15:2

C.15:1

D.30:4

E.30:1

35.语言性健康教育不包括

A.交谈

B.健康咨询

C.小组讨论

D.同伴教育

E.卫生专栏

36.肝性脑病的发病机制中氨中毒的主要机制是

A.干扰脑的血液循环

B.干扰脑的能量代谢

C.抑制神经递质

D.兴奋神经递质

E.抑制神经传导

37.上消化道出血最常见的原因是




- A.消化性溃疡
- B.食管胃底静脉曲张
- C.急性胃黏膜损害
- D.胃癌
- E.慢性胃炎

38.颅内内容物主要包括的三个部分是

- A.脑组织、脑脊液和组织液
- B.脑组织、脑脊液和淋巴
- C.脑组织、脑脊液和血液
- D.脑组织、组织液和淋巴
- E.脑室、脑脊液和血液

39.有机磷农药中毒常可闻到的气味是

- A.烂苹果味
- B.大蒜味
- C.酒味
- D.杏仁味



E.臭蛋味

40.可以反映心脏前负荷的指标是

A.血压

B.脉搏

C.心排出量

D.肺毛细血管楔压

E.周围血管阻力

41.张力性气胸的最主要病理生理变化

A.反常呼吸运动

B.纵膈摆动

C.进行性伤侧肺压缩

D.呼吸死腔增加

E.血氧分压下降

42.确诊胃癌最佳的检查方法是

A.血生化检查

B.X线钡剂检查



C.腹部 X 线平片

D.纤维胃镜检查

E.MRI

43.外科休克中最为常见的是

A.低血容量性

B.心源性

C.神经性

D.过敏性

E.以上均是

44.幽门梗阻病人持续呕吐可造成

A.低氯高钾碱中毒


B.低钾性酸中毒

C.低氯高钠碱中毒

D.低氯低钾碱中毒

E.低氯低钾酸中毒

45.人体最大的实质性器官是



A.脑

B.肺

C.肝

D.肾

E.脾

46.最常用的协助诊断早孕的辅助检查方法是

A.超声多普勒

B.黄体酮试验

C.B超

D.尿妊娠试验

E.胎儿心电图


47.宫颈癌发病的主要相关因素是

A.吸烟

B.慢性宫颈炎

C.未婚、未育

D.多个性伴侣



E.HPV 病毒感染

48.妊娠期高血压综合征最基本的病理变化是

A.肾脏功能衰退

B.全身小动脉痉挛

C.胎盘绒毛退行性变化

D.胎盘后血肿

E.弥漫性血管内凝血

49.病理性缩复环最常见于

A.高张性宫缩乏力

B.妇女型骨盆

C.软产道损伤

D.头盆不称

E.枕后位

50.在我国产妇最常见的死亡原因是

A.产褥感染

B.产后出血



C.羊水栓塞

D.子宫破裂

E.妊娠合并心脏病

扫码回复“基础测评”领取答案及解析

