

医学教育网主管护师:《答疑周刊》2023年第30期

问题索引:

1. 【问题】肢体抬高试验是什么?
2. 【问题】结肠癌和直肠癌的早期表现是?
3. 【问题】中心静脉压正常值?
4. 【问题】链霉素过敏反应的急救中可选用的药物是?

具体解答:

1. 【问题】肢体抬高试验是什么?

【解答】肢体抬高试验:方法是让病人平卧,下肢抬高 45° ,3分钟后观察足部皮肤色泽变化。若出现足趾皮肤呈苍白或蜡黄色、自觉麻木疼痛,让病人坐起,下肢自然下垂于床沿,足部皮肤出现潮红或发绀者为阳性。有严重供血不足的肢体,常出现以上表现。

2. 【问题】结肠癌和直肠癌的早期表现是什么?

【解答】

结肠癌	最早出现的症状是排便习惯及粪便性状的改变,多表现为排便次数增加,腹泻、便秘、粪便中带脓血或黏液
直肠癌	早期直肠癌主要表现为排便习惯改变和便血,病人便意频繁、便前肛门下坠感、里急后重、排便不尽感等

3. 【问题】中心静脉压正常值?

【解答】中心静脉压(CVP):是测定上、下腔静脉或右心房内的压力,评估血容量、右心前负荷及右心功能的重要指标,正常值 $5\sim 12\text{cmH}_2\text{O}$ 。

- (1) 过低——血容量不足或静脉回流受阻,应给予补液。
- (2) 过高——输入液体量过多或心功能不全。

4. 【问题】链霉素过敏反应的急救中可选用的药物是?

【解答】链霉素过敏反应可静脉缓慢推注10%葡萄糖酸钙(或氯化钙)10ml,

以使钙离子与链霉素络合而减轻中毒症状。



正保医学教育网

www.med66.com