

医学教育网护士执业资格：《答疑周刊》2024年第1期

问题索引：

1. 【问题】急性肾小球肾炎病人出现的全是肉眼血尿吗？
2. 【问题】怎么区分是蛛网膜下腔出血和脑出血？
3. 【问题】肺癌术后安置什么样的体位？
4. 【问题】心脏瓣膜病最常累及的瓣膜是什么？有什么表现？

具体解答：

1. 【问题】急性肾小球肾炎病人出现的全是肉眼血尿吗？

【解答】不是的，急性肾小球肾炎的临床表现：血尿——几乎全部患者均有肾小球源性血尿，镜下血尿为主，[医学教育网原创]肉眼血尿尿色可呈洗肉水样。通常肉眼血尿1~2周后即转为镜下血尿，少数持续3~4周。

2. 【问题】怎么区分是蛛网膜下腔出血和脑出血？

【解答】脑出血是脑实质出血，会出现颅内压增高，肢体瘫痪等。

蛛网膜下腔出血是脑表面血管破裂，会出现剧烈头痛、脑膜刺激征，一般无肢体瘫痪。

3. 【问题】肺癌术后安置什么样的体位？

【解答】肺段切除术或楔形切除术者，尽量选择健侧卧位，以促进患侧肺组织扩张。

一侧肺叶切除者，如呼吸功能尚可，可取健侧卧位，以利于手术侧残余肺组织的膨胀与扩张；如呼吸功能较差，[医学教育网原创]则取平卧位，避免健侧肺受压而限制肺的通气功能。

全肺切除术者，应避免过度侧卧，可采取1/4侧卧位，以预防纵隔移位和压迫健侧肺而导致呼吸循环功能障碍。

咯血或支气管瘘管者，取患侧卧位。

4. 【问题】心脏瓣膜病最常累及的瓣膜是什么？有什么表现？

【解答】心脏瓣膜病最常累及的瓣膜是二尖瓣，其次是主动脉瓣。

二尖瓣狭窄时最常出现的早期症状是劳力性呼吸困难，伴有咳嗽，随病情加重，可出现阵发性夜间呼吸困难，[医学教育网原创]严重时可导致肺水肿；患者出现面部两颧绀红、口唇轻度发绀，称“二尖瓣面容”；心尖部可闻及舒张期隆隆样杂音。

