

医学教育网主管护师:《答疑周刊》2024年第19期

问题索引:

1. 【问题】各种阴道炎的鉴别?
2. 【问题】绒毛膜癌转移灶症状?
3. 【问题】心源性水肿与肾源性水肿的鉴别?

具体解答:

1. 【问题】各种阴道炎的鉴别?

【解答】

	滴虫性阴道炎	外阴阴道假丝酵母菌病 (VVC)	萎缩性阴道炎
病原体	阴道毛滴虫	白假丝酵母菌	--
诱因	阴道环境 PH ↑	PH ↓、妊娠、糖尿病, 广谱抗菌素	PH ↑
传播方式	性交(性传播疾病)	内源性传染	--
症状	脓性泡沫状白带、 外阴瘙痒	白带多且呈豆渣样、剧 烈的外阴瘙痒	稀薄淡黄色或血 性白带
体征	阴道充血、点状出 血、泡沫状物	阴道充血糜烂、阴道黏 膜上附着白色膜样物	阴道黏膜充血;常 有小出血点
化验	悬滴法查见滴虫	悬滴法找芽孢及假丝酵 母菌	大量白细胞及基 底层细胞,无滴虫 及念珠菌
夫妻同治	是	对有症状的性伴侣应同 时进行治疗,无症状者 无需治疗	否

2. 【问题】绒毛膜癌转移灶症状?

【解答】阴道转移——破溃出血可发生阴道大出血;

肺转移——咯血、胸痛及憋气等;

脑转移——头痛、喷射性呕吐、抽搐、偏瘫以及昏迷等;

肝和脾转移——呕血及柏油样大便;

肾转移——血尿。

3. 【问题】心源性水肿与肾源性水肿的鉴别?

【解答】(1) 心源性水肿发生机制:

①由于右心衰时体循环静脉淤血,有效循环血容量减少,使肾血流量减少,继发性醛固酮增多而引起水钠潴留。

②静脉压增高使毛细血管内压力增高,使液体自毛细血管内渗透至组织间隙的量多于回吸收的量,从而导致水肿。

心源性水肿的特点:水肿先出现在身体下垂部位,一般病人易出现在双下肢,卧床病人常出现于枕部、肩胛部及腰骶部等,严重水肿病人可出现胸腔和腹腔的积液。

(2) 肾源性水肿

①肾炎性水肿:主要是由于肾小球滤过率下降,而肾小管的重吸收功能正常,从而导致“球-管失衡”,引起水、钠潴留,毛细血管静水压增高而出现水肿。钠水潴留于细胞外液的各个部分,水肿常为全身性,而以眼睑、头皮等组织疏松处为著。

②肾病性水肿:主要是由于大量蛋白尿造成血浆蛋白过低,血浆胶体渗透压降低,导致液体从血管内进入组织间隙而产生水肿。一般较严重,多从下肢开始,由于增加的细胞外液量主要潴留在组织间隙,血容量常减少,故可无高血压及循环淤血的表现。