

医学教育网外科主治医师：《答疑周刊》2024年第28期

小肠、结肠疾病与肛管、直肠疾病是每年考试必考的知识点。今天咱们一起来回顾一下这几个知识点。

问题索引：

1. 老年人肠梗阻的原因最常见的是？
2. 溃疡性结肠炎病变多发于哪个位置？
3. 最多见的直肠肛管周围脓肿是什么？
4. 发生切口疝最主要的病因是什么？

具体解答：

1. 老年人肠梗阻的原因最常见的是

- A. 肠套叠
- B. 肠粘连
- C. 肠痉挛
- D. 肠道肿瘤
- E. 肠管扭转

【答案】 D

【解析】肠梗阻要结合年龄、病史、临床表现、X线检查等进行分析，要熟悉下列病因特点：新生儿以先天性肠道畸形为多见；2岁以内多为肠套叠；儿童可由蛔虫团所致；青壮年饱餐剧烈活动后应想到肠扭转；老年人则要考虑粪块阻塞、肿瘤及乙状结肠扭转。

2. 溃疡性结肠炎病变多位于

- A. 回肠末端及升结肠
- B. 直肠及乙状结肠
- C. 降结肠
- D. 全结肠
- E. 升结肠

【答案】 B

【解析】直肠及乙状结肠为[医学教育网原创]溃疡性结肠炎的好发部位。

3. 最多见的直肠肛管周围脓肿是

- A. 肛门周围脓肿
- B. 骨盆直肠窝脓肿
- C. 坐骨直肠窝脓肿
- D. 直肠后间隙脓肿
- E. 直肠黏膜下脓肿

【答案】A

【解析】直肠肛管周围脓肿的感染灶多来自肛腺。最多见的是肛腺[医学教育网原创]感染向下蔓延至肛门周围皮下形成脓肿。

4. 发生切口疝最主要的病因是

- A. 切口过长，缝合不够严密，对合差
- B. 引流物放置太久
- C. 切口发生感染
- D. 病人手术腹胀
- E. 腹部手术切口为纵行切口

【答案】C

【解析】切口疝是发生于手术切口的疝，多见于腹部纵形切口者。其中最主要的切口感染[医学教育网原创]所致腹壁组织破坏，约占全部病例的50%左右，其他如留置引流物过久、切口过长、缝合不严密、术后腹胀均可导致切口疝的发病。

www.med66.com